

# Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 30/07/2023

Sur le site: **CHIROULET**

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Agaricus augustus</i>	Fr., 1838	-	.	Agaric impérial
<i>Amanita coryli</i>	Neville & Poumarat, 2009	-	.	
<i>Amanita fulva</i>	(Schaeff. ?) Fr.	-	.	Amanite fauve
<i>Amanita pantherina</i>	(DC. : Fr.) Krombh.	-	.	Amanite panthère
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	-	.	Golmotte, amanite vineuse
<i>Amanita umbrinolutea</i>	(Secrétan ex Gillet) Batail	-	.	Amanite à cerne sombre
<i>Bisporella citrina</i>	(Batsch : Fr.) Korf & S.E.	-	.	Bisporelle citrine
<i>Bjerkandera adusta</i>	(Willd. : Fr.) P.Karst., 18	-	.	Polypore brûlé
<i>Boletus aestivalis</i>	(Paulet) Fr., 1838	-	.	Cèpe d'été, Cèpe réticulé
<i>Boletus calopus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Bolet à beau pied
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Pied rouge
<i>Boletus luridus</i>	Schaeff. : Fr.	-	.	Bolet blafard
<i>Boletus pulverulentus</i>	Opatowski	-	.	Bolet pulvérulent
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Calocère visqueuse
<i>Cantharellus amethysteus</i>	(Quél.) Sacc., 1887	-	.	Girolle améthyste
<i>Cantharellus friesii</i>	Quél., 1872	-	.	Chanterelle abricot
<i>Cantharellus subpruinus</i>	Eyssartier & Buyck	-	.	Girolle presque pruineuse
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	(Nyl.) Kanouse ex C.S.Ra	-	.	Pezize turquoise
<i>Clavicornia pyxidata</i>	(Pers. : Fr.) Doty	-	.	Clavaire couronnée
<i>Clavulina coralloides</i>	(L. : Fr.) J.Schröt., 1889	-	.	Clavaire à crêtes
<i>Clitocybe gibba</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Clitocybe en entonnoir
<i>Clitocybe umbilicata</i>	(Schaeff. ?) Kumm.	-	.	Clitocybe ombiliqué
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop. : Fr.) Kumm.	-	.	Meunier
<i>Collybia aquosa</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie aqueuse
<i>Collybia confluens</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie en touffes
<i>Collybia peronata</i>	(Bolt. : Fr.) Kumm.	-	.	Marasme poivré
<i>Collybia prolixa var. distorta</i>	(Fr.) P. Roux	-	.	Collybie tordue
<i>Coltricia perennis</i>	(L. : Fr.) Gray	-	.	Coltricie
<i>Coprinopsis lagopus</i>	(Fr.) Redhead, Vilgalys &	-	.	
<i>Craterellus cinereus</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Chanterelle cendrée
<i>Craterellus cornucopioides</i>	(L. : Fr.) Pers.	-	.	Trompette des morts
<i>Crucibulum laeve</i>	(Huds.) Kambly, 1936	-	.	Crucibule lisse
<i>Cyathus striatus</i>	(Huds. : Pers.) Willd.	-	.	Cyathe strié
<i>Cyphella digitalis</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Fr	-	.	
<i>Didymium nigripes</i>	(Link) Fr., 1829	-	.	
<i>Ditiola pezizaeformis</i>	(Lév.) D.A. Reid	-	.	Ditiole en forme de pezize
<i>Entoloma pseudocaelestinum</i>	Arnolds	-	.	
<i>Entoloma rhodopolium</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	Entolome gris rosâtre
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	-	.	Amadouvier des conifères
<i>Fuligo leviderma</i>	H.Neubert, Nowotny & K.	-	.	
<i>Fuligo septica</i>	(L.) F.H.Wigg., 1780	-	.	Fleur de tan
<i>Ganoderma carnosum</i>	Pat.	-	.	Ganoderme luisant charnu
<i>Ganoderma lipsiense</i>	(Batsch) G.F.Atk., 1908	-	.	Ganoderme aplani
<i>Ganoderma valesiacum</i>	Boud.	-	.	

# Liste des taxons répertoriés le : 30/07/2023

## Sur le site: CHIROULET

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Geastrum sessile</i>	(Sowerby) Pouzar, 1971	-	.	Géastre frangé
<i>Geastrum triplex</i>	Junghuhn	-	.	Géastre à trois peaux
<i>Gymnopilus picreus</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.	-	.	Gymnopile amer
<i>Gyroporus cyanescens</i>	(Bull. : Fr.) Quéf.	-	.	Bolet indigotier
<i>Helvella lacunosa</i>	Afz. : Fr., non (Pers.)	-	.	Helvelle lacuneuse
<i>Heterobasidion abietinum</i>	Niemelä & Korhonen, 199	-	.	Hétérobaside du sapin
<i>Humaria hemisphaerica</i>	(Weber : Fr.) Fuckel	-	.	Lachnée hémisphérique
<i>Hydnum rufescens</i>	Pers. : Fr.	-	.	Pied de mouton roux
<i>Inocybe cervicolor</i>	(Pers.) Quéf., 1886	-	.	Inocybe couleur de cerf
<i>Inocybe geophylla</i>	(Sowerby : Fr.) P.Kumm.,	-	.	Inocybe à lames terreuses
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke	-	.	Améthyste, petit violet
<i>Lactarius azonites</i>	(Bull.) Fr., 1838	-	.	Lactaire non zoné
<i>Lactarius blennius</i>	(Fr.) Fr., 1838	-	.	Lactaire muqueux
<i>Lactarius camphoratus</i>	(Bull.) Fr., 1838	-	.	Lactaire camphré
<i>Lactarius flavidus</i>	Boudier, non ss Lange	-	.	
<i>Lactarius intermedius</i>	(Fr. ?) Cooke	-	.	Lactaire du sapin blanc
<i>Lactarius pallidus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Lactaire pâle
<i>Lactarius romagnesii</i>	Bon, 1979	-	.	Lactaire des hêtraies
<i>Lactarius rubrocinctus</i>	Fr., 1863	-	.	Lactaire cerné de rouge
<i>Lactarius salmonicolor</i>	Heim & Leclair	-	.	Lactaire saumoné
<i>Lactarius volemus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Lactaire à lait abondant
<i>Leccinum carpini</i>	(R. Schulz) Moser ex D.A.	-	.	Bolet des charmes
<i>Lepiota ignivolvata</i>	Bousset & Jossierand ex B	-	.	Lépiote à base rouge
<i>Lepiota ventriospora</i>	D.A. Reid, 1958	-	.	Lépiote à spores ventruées
<i>Leucopaxillus paradoxus</i>	(Constantin & Dufour) Bou	-	.	
<i>Lycogala epidendrum</i>	(L.) Fr., 1829	-	.	Lait de loup
<i>Lycoperdon molle</i>	Pers. : Pers.	-	.	Vesse de loup molle
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	-	.	Marasme à odeur d'ail
<i>Marasmius cohaerens</i>	(Pers. : Fr.) Cooke & Qué	-	.	Marasme à pied corné
<i>Marasmius oreades</i>	(Bolt. : Fr.) Fr.	-	.	Faux mousseron
<i>Marasmius rotula</i>	(Scop. : Fr.) Fr.	-	.	Marasme petite roue
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & Po	-	.	Collybie à larges lames
<i>Mutinus caninus</i>	(Huds. : Pers.) Fr.	-	.	Satyre du chien
<i>Mycena acicula</i>	(Schaeff.) Kumm.	-	.	Mycène très fine
<i>Mycena haematopus</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Mycène à lait rouge
<i>Mycena pelianthina</i>	(Fr. : Fr.) Quéf.	-	.	Mycène livide
<i>Mycena pura f. ianthina</i>	(Gillet) Maas Geesteranus	-	.	Mycène pur forme bleuté
<i>Mycena rosea</i>	(Bull. ? Pers.) Gramberg	-	.	Mycène rose
<i>Panaeolus sphinctrinus</i>	(Fr.) Quéf., 1872	-	.	Panéole à marge dentée
<i>Paxillus involutus</i>	(Batsch : Fr.) Fr.	-	.	Paxille enroulé
<i>Phallus impudicus</i>	L. : Pers.	-	.	Phalle impudique
<i>Phellinus hartigii</i>	(Allesch. & Schnabl) Pat.	-	.	Amadouvier du sapin
<i>Phylloporus pelletieri</i>	(Lév.) Quéf.	-	.	Bolet à lamelles
<i>Pleurotus ostreatus</i>	(Jacq.) Kumm., 1871	-	.	Pleurote en huître
<i>Pleurotus pulmonarius</i>	(Fr. : Fr.) Quéf.	-	.	Pleurote pulmonaire
<i>Pluteus boudieri</i>	P.D. Orton, 1960	-	.	Plutée de Boudier
<i>Polyporus ciliatus</i>	Fr. : Fr.	-	.	Polypore cilié
<i>Polyporus leptcephalus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr., 1821	-	.	Polypore variable

# Liste des taxons répertoriés le : 30/07/2023

Sur le site: **CHIROULET**

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Polyporus melanopus</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Polypore à pied noir
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	(Fr.) E.-J. Gilbert	-	.	Bolet porphyre
<i>Pseudoomphalina graveolens</i>	(S. Petersen) Singer ex Co	-	.	Clitocybe à pied comprimé
<i>Pycnoporellus fulgens</i>	(Fr.) Donk, 1971	-	.	Polypore flamboyant
<i>Rhodocybe gemina</i>	(Paulet ex Fr.) Kuyper &	-	.	Rhodocybe tronqué
<i>Rickenella fibula</i>	(Bull. : Fr.) Raithelh., 197	-	.	Omphale bibelot
<i>Russula acrifolia</i>	Romagn. ex Romagn.	-	.	Russule à lames âcres
<i>Russula amethystina</i>	Quél., 1898	-	.	Russule améthyste
<i>Russula anthracina</i>	Romagn., 1962	-	.	Russule anthracite
<i>Russula aurea</i>	Pers., 1796	-	.	Russule dorée
<i>Russula cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.	-	.	Russule charbonnière
<i>Russula cyanoxantha f. peltereaui</i>	Singer, 1925	-	.	Russule charbonnière verte
<i>Russula densifolia</i>	Gillet	-	.	Russule à lames denses
<i>Russula fageticola</i>	Melzer ex S.Lundell, 1956	-	.	Russule du hêtre
<i>Russula ochroleuca</i>	Pers.	-	.	Russule ocre et blanc
<i>Russula olivacea</i>	(Schaeff.) Fr.	-	.	Russule olivacée
<i>Russula solaris</i>	Ferdinansen & Winge	-	.	Russule solaire
<i>Russula subfoetens</i>	W.G. Smith	-	.	Russule presque fétide
<i>Russula violeipes f. citrina</i>	(Quél.) Romagn.	-	.	Russule à pied violet forme jaune
<i>Scleroderma citrinum</i>	Pers. : Pers., 1801	-	.	Scléroderme vulgaire
<i>Scutellinia superba</i>	(Velen.) Le Gal	-	.	
<i>Scutigiger cristatus</i>	(Schaeff. : Fr.) Bondarze	-	.	Polypore à crête
<i>Setulipes androsaceus</i>	(L. : Fr.) Antonín	-	.	Marasme androsace
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	-	.	Stérée hirsute
<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	(Scop. : Fr.) Berk.	-	.	Bolet pomme de pin
<i>Stropharia semiglobata</i>	(Batsch : Fr.) Quél., 1872	-	.	Strophaire demi sphérique
<i>Thelephora palmata</i>	(Scop. : Fr.) Fr.	-	.	Théléphore palmé
<i>Trametes gibbosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Tramète bossue
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	-	.	Tramète versicolore
<i>Tricholoma columbetta</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	Colombette
<i>Tricholoma sciodes</i>	(Pers.) C. Martin	-	.	Tricholome gris
<i>Tricholoma stiparophyllum</i>	(Lund) P.Karst.	-	.	Tricholome des bouleaux
<i>Tricholoma sulphureum</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Tricholome soufré
<i>Tricholoma virgatum</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	Tricholome vergeté
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer	-	.	Tricholome rutilant
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Quél., 1888	-	.	Bolet à chair jaune
<i>Xerocomus ferrugineus</i>	(Schaeff.) Bon	-	.	Bolet ferrugineux
<i>Xerocomus pruinatus</i>	(Fr.) Quél.	-	.	Bolet pruineux
<i>Xerula radicata</i>	(Rehl. : Fr.) Dörfelt	-	.	Collybie radicante
<i>Xerula radicata f. marginata</i>	(Konrad & Maubl.) R.H.	-	.	Collybie radicante à arêtes brun n
<i>Xylaria polymorpha</i>	(Pers.) Grev., 1824	-	.	Xylaire polymorphe

Nombre de participants : 52

Nombre de taxons répertoriés : 133