

# Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 30/07/2023

Sur le site: OUBAC

Taxons		Hôte		Nom français
<i>Amanita coryli</i>	Neville & Poumarat, 2009	-	.	
<i>Amanita excelsa</i>	(Fr. : Fr.) Bertillon	-	.	Amanite élevée
<i>Amanita fulvoides</i>	Neville & Poumarat, 2009	-	.	
<i>Amanita phalloides</i>	(Fr. : Fr.) Link	-	.	Amanite phalloïde
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	-	.	Golmotte, amanite vineuse
<i>Amanita vaginata</i>	(Bull. : Fr.) Vittad.	Cf	.	Amanite vaginée, grisette
<i>Ascodichaena rugosa</i>	Butin, 1977	-	Fagus sylvatica	
<i>Bisporella citrina</i>	(Batsch : Fr.) Korf & S.E.	-	.	Bisporelle citrine
<i>Boletus aestivalis</i>	(Paulet) Fr., 1838	-	.	Cèpe d'été, Cèpe réticulé
<i>Boletus calopus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Bolet à beau pied
<i>Boletus luridus</i>	Schaeff. : Fr.	-	.	Bolet blafard
<i>Calocera cornea</i>	(Batsch : Fr.) Fr., 1827	-	.	Calocère cornée
<i>Calocera furcata</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Calocère des conifères
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Calocère visqueuse
<i>Cantharellus amethysteus</i>	(Quél.) Sacc., 1887	-	.	Girolle améthyste
<i>Cantharellus friesii</i>	Quél., 1872	-	.	Chanterelle abricot
<i>Cantharellus subpruinus</i>	Eyssartier & Buyck	-	.	Girolle presque pruineuse
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	(Nyl.) Kanouse ex C.S.Ra	-	.	Pezize turquoise
<i>Clavicornia pyxidata</i>	(Pers. : Fr.) Doty	-	.	Clavaire couronnée
<i>Clavulina coralloides</i>	(L. : Fr.) J.Schröt., 1889	-	.	Clavaire à crêtes
<i>Clavulina rugosa</i>	(Bull. : Fr.) J. Schröt.	-	.	Clavaire rugueuse
<i>Clitocybe costata</i>	Kühner & Romagn. ex Kü	Cf	.	Clitocybe côtelé
<i>Clitocybe gibba</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Clitocybe en entonnoir
<i>Clitocybe odora</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Clitocybe odorant, anisé
<i>Clitocybe phaeophthalma</i>	(Pers.) Kuyper, 1981	-	.	Clitocybe à odeur de poulailler
<i>Collybia aquosa</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie aqueuse
<i>Collybia confluens</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie en touffes
<i>Collybia peronata</i>	(Bolt. : Fr.) Kumm.	-	.	Marasme poivré
<i>Coltricia perennis</i>	(L. : Fr.) Gray	-	.	Coltricie
<i>Cortinarius bolaris</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Cortinaire rougeâtre
<i>Cortinarius orellanus</i>	Fr., 1838	-	.	Cortinaire couleur de rocou
<i>Cortinarius rubicundulus</i>	(Rea) A. Pearson, 1946	-	.	Cortinaire rubicond
<i>Cortinarius torvus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Cortinaire farouche ou à pied cou
<i>Craterellus cinereus</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Chanterelle cendrée
<i>Craterellus cornucopioides</i>	(L. : Fr.) Pers.	-	.	Trompette des morts
<i>Craterellus sinuosus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Chanterelle sinueuse
<i>Cyathus striatus</i>	(Huds. : Pers.) Willd.	-	.	Cyathe strié
<i>Entoloma rhodopolium</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	Entolome gris rosâtre
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	-	.	Amadouvier des conifères
<i>Fuscoportia ferruginosa</i>	(Schrad. : Fr.) Murrill	Val	.	Phellin ferrugineux
<i>Galerina marginata</i>	(Batsch) Kühner, 1935	-	.	Galère marginée
<i>Ganoderma carnosum</i>	Pat.	-	.	Ganoderme luisant charnu
<i>Ganoderma lipsiense</i>	(Batsch) G.F.Atk., 1908	-	.	Ganoderme aplani
<i>Geastrum sessile</i>	(Sowerby) Pouzar, 1971	-	.	Géastre frangé

# Liste des taxons répertoriés le : 30/07/2023

Sur le site: OUBAC

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Guepiniopsis buccina</i>	(Pers. : Fr.) Kennedy	-	.	Guépinie en coupe
<i>Helvella elastica</i>	Bull. : Fr.	-	.	Helvelle élastique
<i>Helvella lacunosa</i>	Afz. : Fr., non (Pers.)	-	.	Helvelle lacuneuse
<i>Heterobasidion abietinum</i>	Niemelä & Korhonen, 199	-	.	Hétérobaside du sapin
<i>Hohenbuehelia auriscalpium</i>	(Maire) Singer	Val	.	
<i>Hydnum repandum f. rufescens</i>	.....	Cf	.	Pied de mouton roussâtre
<i>Hydropus subalpinus</i>	(Höhn.) Singer	-	.	Mycène subalpine
<i>Hymenochaete corrugata</i>	(Fr. : Fr.) Lév.	-	Corylus avellana	Hyménochaète du noisetier
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i>	(T.Kowalski) Baral, Quelo	-	.	
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 18	-	.	Hypholome en touffe
<i>Hypomyces chrysospermus</i>	(Bulliard : Fr.) L.R. et C.	-	strobylomyces strobilac	Dermatose des bolets
<i>Hypoxyylon cazenavei</i>	J. Fourn., 2014	Val	Fagus sylvatica	
<i>Hypoxyylon fragiforme</i>	(Scopoli : Fr.) Kickx	-	Fagus sylvatica	Hypoxyylon en forme de fraise
<i>Inocybe corydalina</i>	Quél., 1875	-	.	Inocybe à mamelon vert
<i>Inocybe geophylla</i>	(Sowerby : Fr.) P.Kumm.,	-	.	Inocybe à lames terreuses
<i>Inocybe geophylla var. lilacina</i>	(Peck) Gillet, 1876	-	.	Inocybe terreux lilacin
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer & A	-	.	Pholiote changeante
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke	-	.	Améthyste, petit violet
<i>Lactarius azonites</i>	(Bull.) Fr., 1838	-	.	Lactaire non zoné
<i>Lactarius camphoratus</i>	(Bull.) Fr., 1838	-	.	Lactaire camphré
<i>Lactarius pallidus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Lactaire pâle
<i>Lactarius piperatus</i>	(L. : Fr.) Pers.	-	.	Lactaire poivré
<i>Lactarius pterosporus</i>	Romagn., 1949	Val	.	Lactaire à spores ailées
<i>Lactarius salmonicolor</i>	Heim & Leclair	-	.	Lactaire saumoné
<i>Lactarius scrobiculatus</i>	(Scop. : Fr.) Fr.	-	.	Lactaire à fossettes
<i>Lactarius volemus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Lactaire à lait abondant
<i>Leccinum carpini</i>	(R. Schulz) Moser ex D.A.	-	.	Bolet des charmes
<i>Lenzites betulinus</i>	(L. : Fr.) Fr.	-	.	Lenzite du bouleau
<i>Leotia lubrica</i>	(Scop.) Pers. : Fr.	-	.	Léotie visqueuse
<i>Lycogala epidendrum</i>	(L.) Fr., 1829	-	.	Lait de loup
<i>Marasmiellus perforans</i>	(Hoffm. : Fr.) Antonín, Ha	-	.	Marasme perforant
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	-	.	Marasme à odeur d'ail
<i>Marasmius cohaerens</i>	(Pers. : Fr.) Cooke & Qué	-	.	Marasme à pied corné
<i>Marasmius rotula</i>	(Scop. : Fr.) Fr.	-	.	Marasme petite roue
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & Po	-	.	Collybie à larges lames
<i>Mutinus caninus</i>	(Huds. : Pers.) Fr.	-	.	Satyre du chien
<i>Mycena pelianthina</i>	(Fr. : Fr.) Quél.	-	.	Mycène livide
<i>Mycena renatii</i>	Quél.	-	.	Mycène à pied jaune
<i>Mycena stylobates</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Mycène à socle
<i>Otidea onotica</i>	(Pers. : Fr.) Fuckel	-	.	Oreille de lièvre
<i>Oudemansiella mucida</i>	(Schrad. : Fr.) Höhn.	-	.	Mucidule visqueuse
<i>Panellus stipticus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	-	.	Panelle styptique
<i>Panus lecomtei</i>	(Fr.) Corner, 1981	-	.	
<i>Parasola plicatilis</i>	(Curt. : Fr.) Redhead, Vil	-	.	Coprin plissé
<i>Phallus impudicus</i>	L. : Pers.	-	.	Phalle impudique
<i>Pholiota astragalina</i>	(Fr. : Fr.) Singer	-	.	Pholiote astragale
<i>Phylloporus pelletieri</i>	(Lév.) Quél.	-	.	Bolet à lamelles
<i>Pleurotus ostreatus</i>	(Jacq.) Kumm., 1871	-	.	Pleurote en huître

# Liste des taxons répertoriés le : 30/07/2023

Sur le site: OUBAC

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Polyporus ciliatus</i>	Fr. : Fr.	-	.	Polypore cilié
<i>Polyporus lentus</i>	Berk., 1860	-	.	Polypore visqueux
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	(Scop. : Fr.) P.Karst., 186	-	.	Hydne gélatineux
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	(Jacq. : Fr.) P.Karst.	-	.	Polypore cinabre
<i>Ramaria pallida</i>	(Schaeff.) Ricken	<b>Cf</b>	.	Ramaire pâle
<i>Rickenella fibula</i>	(Bull. : Fr.) Raithelh., 197	-	.	Omphale bibelot
<i>Russula acrifolia</i>	Romagn. ex Romagn.	-	.	Russule à lames âcres
<i>Russula amoena</i>	Quél., 1881	-	.	Russule agréable
<i>Russula delicata</i>	Fr., 1838	-	.	Russule "sans lait"
<i>Russula olivacea</i>	(Schaeff.) Fr.	-	.	Russule olivacée
<i>Russula solaris</i>	Ferdinansen & Winge	-	.	Russule solaire
<i>Russula subfoetens</i>	W.G. Smith	-	.	Russule presque fétide
<i>Russula violeipes</i>	Quél., 1898	-	.	Russule à pied violet
<i>Russula violeipes f. citrina</i>	(Quél.) Romagn.	-	.	Russule à pied violet forme jaune
<i>Schizophyllum commune</i>	Fr. : Fr., 1815	-	.	Schizophylle commune
<i>Scleroderma areolatum</i>	Ehrenb.	-	.	Scléroderme aréolé
<i>Scleroderma verrucosum</i>	(Bull. : Pers.) Pers.	-	.	Scléroderme verruqueux
<i>Sebacina incrustans</i>	(Pers. : Fr.) Tul. & C. Tul.	-	.	Sébacine incrustante
<i>Setulipes androsaceus</i>	(L. : Fr.) Antonin	-	.	Marasme androsace
<i>Steccherinum ochraceum</i>	(Pers.) Gray, 1821	-	.	Hydne ocré
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	-	.	Stérée hirsute
<i>Stereum rugosum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Stérée rugueuse
<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	(Scop. : Fr.) Berk.	-	.	Bolet pomme de pin
<i>Tarzetta catinus</i>	(Holmskj. ex Fr.) Korf & J	-	.	
<i>Thelephora palmata</i>	(Scop. : Fr.) Fr.	<b>Val</b>	.	Théléphore palmé
<i>Trametes gibbosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Tramète bossue
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	-	.	Tramète versicolore
<i>Tremella mesenterica</i>	Retz. : Fr., 1769	-	.	Trémelle mésentérique
<i>Trichaptum abietinum</i>	(Dicks. : Fr.) Ryvarden	-	.	Coriole du sapin
<i>Tricholomopsis decora</i>	(Fr. : Fr.) Singer	-	.	Tricholome décoré
<i>Xerocomus armeniacus</i>	(Quél.) Quél., 1888	-	.	Bolet abricot
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Quél., 1888	-	.	Bolet à chair jaune
<i>Xerocomus pruinatus</i>	(Fr.) Quél.	-	.	Bolet pruineux
<i>Xerula radicata</i>	(Rehl. : Fr.) Dörfelt	-	.	Collybie radicante
<i>Xerula radicata f. marginata</i>	(Konrad & Maubl.) R.H.	-	.	Collybie radicante à arêtes brun n

Nombre de participants : 52

Nombre de taxons répertoriés : 127