

# Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 28/10/2023

Sur le site: LOURDIOS

Taxons		Hôte		Nom français
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	-	.	Golmotte, amanite vineuse
<i>Annulohyphoxylon cohaerens</i>	(Pers. : Fr.) Y.M.Ju, J.D.R	-	.	
<i>Armillaria gallica</i>	Marxmüller & Romagn.	-	.	Armillaire bulbeuse
<i>Armillaria mellea</i>	(Vahl : Fr.) Kumm.	-	.	Armillaire couleur de miel
<i>Bisporella citrina</i>	(Batsch : Fr.) Korf & S.E.	-	.	Bisporelle citrine
<i>Bjerkandera adusta</i>	(Willd. : Fr.) P.Karst., 18	-	.	Polypore brûlé
<i>Boletus pulverulentus</i>	Opatowski	-	.	Bolet pulvérulent
<i>Byssocorticium atrovirens</i>	(Fr. : Fr.) Bondarzew & S	-	.	
<i>Cantharellus amethysteus</i>	(Quél.) Sacc., 1887	-	.	Girolle améthyste
<i>Cantharellus cibarius</i>	Fr. : Fr.	-	.	Girolle, chanterelle
<i>Cantharellus friesii</i>	Quél., 1872	-	.	Chanterelle abricot
<i>Chlorophyllum rhacodes</i>	(Vittad.) Vellinga	-	.	Lépiote déguenillée
<i>Clathrus archeri</i>	(Berk.) Dring, 1980	-	.	Anthurus d'Archer
<i>Clavulina coralloides</i>	(L. : Fr.) J.Schröt., 1889	-	.	Clavaire à crêtes
<i>Clitocybe phaeophthalma</i>	(Pers.) Kuyper, 1981	-	.	Clitocybe à odeur de poulailler
<i>Clitocybe phyllophila</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	Cf	.	Clitocybe des feuilles
<i>Collybia butyracea</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie beurrée
<i>Collybia confluens</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie en touffes
<i>Collybia peronata</i>	(Bolt. : Fr.) Kumm.	-	.	Marasme poivré
<i>Craterellus cinereus</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Chanterelle cendrée
<i>Cuphophyllum pratensis</i>	(Pers. : Fr.) Bon	-	.	Hygrophore des prés
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	(Bolt. : Fr.) J. Schröt.	-	.	Tramète rougissante
<i>Daedaleopsis tricolor</i>	(Bull. : Fr.) Bondarzew &	-	.	Tramète rougissante
<i>Diatrype decorticata</i>	(Pers. : Fr.) Rappaz	-	.	
<i>Fomes fomentarius</i>	(L. : Fr.) Fr.	-	.	Amadouvier
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	-	.	Amadouvier des conifères
<i>Fuscoporia ferruginosa</i>	(Schrad. : Fr.) Murrill	-	.	Phellin ferrugineux
<i>Galerina marginata</i>	(Batsch) Kühner, 1935	-	.	Galère marginée
<i>Ganoderma lipsiense</i>	(Batsch) G.F.Atk., 1908	-	.	Ganoderme aplani
<i>Helminthosphaeria clavariarum</i>	(L.R.Tulasne) Fuckel	-	.	Parasite de clavaire
<i>Helvella crispa</i>	(Scop.) : Fr.	-	.	Helvelle crépue
<i>Helvella elastica</i>	Bull. : Fr.	-	.	Helvelle élastique
<i>Hydnum rufescens</i>	Pers. : Fr.	Cf	.	Pied de mouton roux
<i>Hygrocybe conica</i>	(Schaeff. : Fr.) P.Kumm.,	Cf	.	Hygrophore conique
<i>Hygrocybe intermedia</i>	(Pass.) Fayod	-	.	Hygrocybe intermédiaire
<i>Hygrophorus chrysodon</i>	(Batsch : Fr.) Fr.	-	.	Hygrophore à dents jaunes
<i>Hygrophorus eburneus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	-	.	Hygrophore blanc d'ivoire
<i>Hymenochaete corrugata</i>	(Fr. : Fr.) Lév.	-	.	Hyménochaète du noisetier
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 18	-	.	Hypholome en touffe
<i>Hypocreopsis rhododendri</i>	Thaxt.	-	.	Hypocrée faux lichen
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	(Scopoli : Fr.) Kickx	-	.	Hypoxylon en forme de fraise
<i>Hypoxylon fuscum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	
<i>Inocybe geophylla var. lilacina</i>	(Peck) Gillet, 1876	-	.	Inocybe terreux lilacin
<i>Irpex bourdotii</i>	(Saliba & A. David) Kotir	-	.	

# Liste des taxons répertoriés le : 28/10/2023

Sur le site: **LOURDIOS**

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Laccaria affinis</i>	(Singer) Bon, 1983	-	.	Laccaire à lames pâles
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke	-	.	Améthyste, petit violet
<i>Lactarius azonites</i>	(Bull.) Fr., 1838	-	.	Lactaire non zoné
<i>Lactarius vellereus var. hometii</i>	(Gillet) Boud.	-	.	Lactaire velouté
<i>Lepista inversa</i>	(Scop. : Fr.) Pat.	-	.	Clitocybe inversé
<i>Lepista nebularis</i>	(Batsch : Fr.) Harmaja	-	.	Clitocybe nébuleux
<i>Lycogala epidendrum</i>	(L.) Fr., 1829	-	.	Lait de loup
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	-	.	Marasme à odeur d'ail
<i>Marasmius wynneae</i>	Berk. & Broome	-	.	Marasme globuleux
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & Po	-	.	Collybie à larges lames
<i>Morganella pyriformis</i>	(Schaeff. : Pers.) Kreisel	-	.	Vesse de loup en forme de poire
<i>Mycena crocata</i>	(Schrad. : Fr.) Kumm.	-	.	Mycène à lait orangé
<i>Mycena galericulata</i>	(Scop. : Fr.) Gray	-	.	Mycène en casque
<i>Mycena leptcephala</i>	(Pers. : Fr.) Gillet	-	.	Mycène chlorée
<i>Mycena polygramma</i>	(Bull. : Fr.) Gray	-	.	Mycène à pied strié
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	-	.	Mycène pure
<i>Mycena romagnesiana</i>	Maas Geesteranus	-	.	Mycène de Romagnesi
<i>Ombrophila pura</i>	(Pers. : Fr.) Baral	-	.	Bulgarie pure
<i>Oudemansiella mucida</i>	(Schrad. : Fr.) Höhn.	-	.	Mucidule visqueuse
<i>Phaeolus schweinitzii</i>	(Fr. : Fr.) Pat.	-	.	Polypore des teinturiers
<i>Phaeotremella frondosa</i>	(Fr.) Spirin & V. Malyshe	-	.	
<i>Phlebia tremellosa</i>	(Schrad. : Fr.) K.K. Naka	-	.	Mérule tremblante
<i>Pleurotus ostreatus</i>	(Jacq.) Kumm., 1871	-	.	Pleurote en huître
<i>Plicaturopsis crispa</i>	(Pers. : Fr.) D.A. Reid	-	.	Plicature du hêtre
<i>Pluteus leoninus</i>	(Schaeff. : Fr.) P.Kumm.,	-	.	Plutée couleur de lion
<i>Pluteus luteovirens</i>	Rea, 1927	-	.	Plutée jaune verdâtre
<i>Polyporus durus</i>	(Timm) Kreisel	-	.	Polypore bai
<i>Postia ptychogaster</i>	(F. Ludwig) Vesterh.	-	.	Polypore fuligineux
<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i>	(Bull. : Fr.) Singer	-	.	Clitocybe en vase
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	(Scop. : Fr.) P.Karst., 186	-	.	Hydne gélatineux
<i>Rickenella fibula</i>	(Bull. : Fr.) Raitheh., 197	-	.	Omphale bibelot
<i>Russula albonigra</i>	(Krombh.) Fr.	-	.	Russule brûlée
<i>Russula cutefracta</i>	Cooke, 1881	-	.	Russule craquelée
<i>Russula cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.	-	.	Russule charbonnière
<i>Russula fageticola</i>	Melzer ex S.Lundell, 1956	-	.	Russule du hêtre
<i>Russula nigricans</i>	(Bull. ?) Fr.	-	.	Russule noircissante
<i>Russula olivacea</i>	(Schaeff.) Fr.	-	.	Russule olivacée
<i>Russula solaris</i>	Ferdinansen & Winge	-	.	Russule solaire
<i>Russula subfoetens</i>	W.G. Smith	-	.	Russule presque fétide
<i>Scleroderma areolatum</i>	Ehrenb.	-	.	Scléroderme aréolé
<i>Scleroderma citrinum</i>	Pers. : Pers., 1801	-	.	Scléroderme vulgaire
<i>Sidera vulgaris</i>	(Fr. : Fr.) Miettinen, 2011	-	.	
<i>Skelotocutis nemoralis</i>	A. Korhonen et Miettinen	-	.	
<i>Sporophagomyces chrysostomus</i>	(Berk. & Broome) K. Pöld	-	.	
<i>Stereum rugosum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Stérée rugueuse
<i>Trametes pubescens</i>	(Schumach. : Fr.) Pilát	-	.	Tramète pubescente
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	-	.	Tramète versicolore

# Liste des taxons répertoriés le : 28/10/2023

Sur le site: LOURDIOS

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Trichaptum biforme</i>	(Fr.) Ryvarden, 1972	-	.	Polypore parchemin
<i>Tricholoma atroquamosum</i>	(Chevall. ?) Sacc.	-	.	Tricholome squameux
<i>Tricholoma columbetta</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	Colombette
<i>Tricholoma saponaceum</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	Tricholome à odeur de savon
<i>Tricholoma sculpturatum</i>	(Fr.) Quéél., 1872	-	.	Tricholome jaunissant
<i>Tricholoma sulphureum</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Tricholome soufré
<i>Tricholoma virgatum</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	Tricholome vergeté
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer	-	.	Tricholome rutilant
<i>Vascellum pratense</i>	(Pers. : Pers.) Kreisel	-	.	Vesse de loup à diaphragme
<i>Xerula radicata</i>	(Rehl. : Fr.) Dörfelt	-	.	Collybie radicante
<i>Xylaria polymorpha</i>	(Pers.) Grev., 1824	-	.	Xylaire polymorphe

Nombre de participants : 16

Nombre de taxons répertoriés : 102