

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 10/11/2023

Sur le site: LESPECIER

Taxons		Hôte		Nom français
<i>Amanita citrina</i>	(Schaeff.) Pers., 1797	-	.	Amanite citrine
<i>Amanita citrina f. alba</i>	(Price) Quél.	-	.	Amanite citrine blanche
<i>Amanita junquillea</i>	Quél., 1877	-	.	Amanite jonquille
<i>Amanita mairei f. supravolvata</i>	(Lanne) Romagn. ex Lann	-	.	
<i>Amanita muscaria</i>	(L. : Fr.) Lamarck	-	.	Amanite tue-mouche, fausse oron
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Calocère visqueuse
<i>Chroogomphus rutilus</i>	(Schaeff. : Fr.) O.K.Mill.,	-	.	Gomphide rutilant, g. visidule
<i>Clavulinopsis laeticolor</i>	(Berk. & M.A.Curtis) R.H.	-	.	
<i>Clitocybe applanata</i>	(Fr.)	-	.	
<i>Collybia cirrhata</i>	(Pers.) Quél.	-	.	Collybie mycophage
<i>Cortinarius mucosus</i>	(Bull. : Fr.) Kickx	-	.	Cortinaire muqueux
<i>Cortinarius torvus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Cortinaire farouche ou à pied cou
<i>Craterellus lutescens</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Chanterelle jaune
<i>Crucibulum laeve</i>	(Huds.) Kambly, 1936	-	.	Crucibule lisse
<i>Cuphophyllus virgineus</i>	(Wulfen : Fr.) Kovalenko	-	.	
<i>Ditiola pezizaeformis</i>	(Lév.) D.A. Reid	-	.	Ditiole en forme de pezize
<i>Gymnopilus penetrans</i>	(Fr. : Fr.) Murrill	-	.	Flammule pénétrante
<i>Gymnopilus spectabilis</i>	(Weinmann : Fr.) Singer	-	.	Pholiote remarquable
<i>Hygrocybe pseudoconica</i>	J.E. Lange, 1923	-	.	Hygrocybe noircissant
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	(Wulfen : Fr.) Maire	-	.	Fausse girolle
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 18	-	.	Hypholome en touffe
<i>Laccaria proxima</i>	(Boud.) Pat.	-	.	Laccaire de Moeller
<i>Lactarius deliciosus</i>	(L.) Gray, 1821	-	.	Lactaire délicieux
<i>Lepiota cristata</i>	(Bolt. : Fr.) Kumm.	-	.	Lépiote crêtée
<i>Leucoagaricus leucothites</i>	(Vittad.) Wasser	-	.	Lépiote pudique
<i>Leucocoprinus brebissonii</i>	(Godey) Locq., 1943	-	.	Lépiote de Brébisson
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Pers., 1796	-	.	Vesse de loup perlée
<i>Macrolepiota fuliginosa</i>	(Barla) Bon, 1977	-	.	Coulemelle sombre
<i>Mycena capillaripes</i>	Peck, ss Kühner, A.H.Smit	-	.	Mycène à pied chevelu
<i>Mycena seynesii</i>	Quél.	-	.	Mycène de De Seynes
<i>Pisolithus arhizus</i>	(Scop. : Pers.) Rauschert	-	.	Pisolithé
<i>Resupinatus trichotis</i>	(Pers.) Singer, 1961	-	.	Pleurote poilu
<i>Rhizopogon luteolus</i>	Fr. & Nordholm	-	.	Rhizopogon jaunâtre
<i>Rhizopogon roseolus</i>	(Corda) Th.Fr.	-	.	Rhizopogon rose pâle
<i>Rickenella fibula</i>	(Bull. : Fr.) Raithelth., 197	-	.	Omphale bibelot
<i>Russula amara</i>	Kucera	-	.	Russule amère
<i>Russula amoena</i>	Quél., 1881	-	.	Russule agréable
<i>Russula badia</i>	Quél., 1881	-	.	Russule baie
<i>Russula cessans</i>	A. Pearson, 1950	-	.	Russule tardive
<i>Russula turci</i>	Bres.	-	.	Russule de Turco
<i>Russula xerampelina</i>	(Schaeff.) Fr.	-	.	Russule feuille-morte
<i>Scleroderma citrinum</i>	Pers. : Pers., 1801	-	.	Scléroderme vulgaire

Liste des taxons répertoriés le : 10/11/2023

Sur le site: LESPECIER

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Scleroderma geaster</i>	Fr., 1829	-	.	Scléroderme géaster
<i>Setulipes androsaceus</i>	(L. : Fr.) Antonin	-	.	Marasme androsace
<i>Sphaerobolus stellatus</i>	Tode : Pers.	-	.	
<i>Stereum sanguinolentum</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Fr	-	.	Stérée sanguinolente
<i>Suillus bellinii</i>	(Inzenga) Kuntze, 1898	-	.	Bolet de Bellini
<i>Suillus bovinus</i>	(L. : Fr.) Roussel	-	.	Bolet des bouviers
<i>Thelephora terrestris</i>	Ehrhart : Fr.	-	.	Théléphore terrestre
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	-	.	Tramète versicolore
<i>Tricholoma equestre</i>	(L. : Fr.) Kumm.	-	.	Tricholome doré
<i>Tricholoma populinum</i>	J.E. Lange, 1933	-	.	Tricholome abimé
<i>Tricholoma saponaceum</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	Tricholome à odeur de savon
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer	-	.	Tricholome rutilant
<i>Xerocomus badius</i>	(Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J.	-	.	Bolet bai

Nombre de participants : 0

Nombre de taxons répertoriés : 55