

# Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 13/09/2024

Sur le site: BERGONS (forêt d ARRAGNAT)

Taxons		Hôte		Nom français
<i>Agaricus essettei</i>	Bon ex Bon	-	.	Agaric à pied bulbeux
<i>Agaricus haemorrhoidarius</i>	Schulzer	-	.	Agaric sanguinolent
<i>Agaricus semotus</i>	Fr., 1863	-	.	Agaric solitaire
<i>Agaricus silvaticus</i>	Schaeff., 1774	-	.	Agaric des forêts
<i>Amanita citrina</i>	(Schaeff.) Pers., 1797	-	.	Amanite citrine
<i>Amanita fulva</i>	(Schaeff. ?) Fr.	-	.	Amanite fauve
<i>Amanita jonquillea</i>	Quél., 1877	-	.	Amanite jonquille
<i>Amanita phalloides</i>	(Fr. : Fr.) Link	-	.	Amanite phalloïde
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	-	.	Golmotte, amanite vineuse
<i>Amanita umbrinolutea</i>	(Secrétan ex Gillet) Batail	-	.	Amanite à cerne sombre
<i>Amanita vaginata</i>	(Bull. : Fr.) Vittad.	Cf	.	Amanite vaginée, grisette
<i>Amanita virosa</i>	Lamarck	-	.	Amanite vireuse
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>	(Pers. : Fr.) Redhead, Lut	-	.	Clitocybe à pied en massue
<i>Annulohyphoxylon cohaerens</i>	(Pers. : Fr.) Y.M.Ju, J.D.R	-	.	
<i>Arcyria denudata</i>	(L.) Wettst., 1886	Cf	.	
<i>Asterophora parasitica</i>	(Bull. : Fr.) Singer	-	.	Astérophore parasite
<i>Bisporella citrina</i>	(Batsch : Fr.) Korf & S.E.	-	Fagus sylvatica	Bisporelle citrine
<i>Boletus aestivalis</i>	(Paulet) Fr., 1838	-	.	Cèpe d'été, Cèpe réticulé
<i>Boletus calopus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Bolet à beau pied
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Pied rouge
<i>Calocera cornea</i>	(Batsch : Fr.) Fr., 1827	-	.	Calocère cornée
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Calocère visqueuse
<i>Cantharellus subpruinus</i>	Eyssartier & Buyck	-	.	Girolle presque pruineuse
<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i>	(O.F.Müll.) T.Macbr., 189	-	.	Fruticuleuse commune
<i>Chalciporus piperatus</i>	(Bull. : Fr.) Bataille	-	.	Bolet poivré
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	(Nyl.) Kanouse ex C.S.Ra	-	.	Pezize turquoise
<i>Clavariadelphus pistillaris</i>	(L. : Fr.) Donk	-	.	Clavaire en pilon
<i>Clavicornia pyxidata</i>	(Pers. : Fr.) Doty	-	Fagus sylvatica	Clavaire couronnée
<i>Clavulina cinerea</i>	(Bull. : Fr.) J. Schröt.	-	.	Clavaire cendré
<i>Clavulina coralloides</i>	(L. : Fr.) J.Schröt., 1889	-	.	Clavaire à crêtes
<i>Clitocybe gibba</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Clitocybe en entonnoir
<i>Clitocybe odora</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Clitocybe odorant, anisé
<i>Clitocybe phaeophthalma</i>	(Pers.) Kuyper, 1981	-	.	Clitocybe à odeur de poulailler
<i>Clitocybe vibecina</i>	(Fr. : Fr.) Quél.	-	.	Clitocybe moisi
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop. : Fr.) Kumm.	-	.	Meunier
<i>Collybia aquosa</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie aqueuse
<i>Collybia cirrhata</i>	(Pers.) Quél.	-	.	Collybie mycophage
<i>Collybia confluens</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie en touffes
<i>Collybia maculata</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Ku	-	.	Collybie tachetée
<i>Coprinus micaceus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	-	.	Coprin micacé
<i>Cortinarius bolaris</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Cortinaire rougeâtre
<i>Cortinarius humicola</i>	(Quél.) Maire	-	.	Cortinaire humicole

# Liste des taxons répertoriés le : 13/09/2024

## Sur le site: BERGONS (forêt d ARRAGNAT)

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Cortinarius infractus</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Cortinaire à marge brisée
<i>Cortinarius olivaceofuscus</i>	Kühner, 1955	-	.	
<i>Cortinarius pallidus</i>	Henry (Non Peck ni Mose)	-	.	
<i>Cortinarius praestans</i>	(Cordier) Gillet, 1876	-	.	Cortinaire remarquable
<i>Cortinarius purpurascens</i>	Fr., 1838	-	.	Cortinaire purpurescent
<i>Cortinarius torvus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Cortinaire farouche ou à pied cou
<i>Craterellus cornucopioides</i>	(L. : Fr.) Pers.	-	.	Trompette des morts
<i>Craterellus tubaeformis</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	-	.	Chanterelle en tube
<i>Crucibulum laeve</i>	(Huds.) Kambly, 1936	-	.	Crucibule lisse
<i>Cystoderma amianthinum</i>	(Scop.) Fayod, 1889	-	.	Cystoderme amiantacé
<i>Cystoderma cinnabarinum</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Fa	-	.	Cystoderme cinabre
<i>Diatrypella verruciformis</i>	(Ehrh.) Nitschke, 1867	-	Corylus avellana	Diatrype en forme de verrue
<i>Entoloma rhodopolium</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	Entolome gris rosâtre
<i>Entoloma rhodopolium f. nidorosum</i>	(Fr.) Noordeloos	-	.	Entolome à odeur de nitre
<i>Exidia nigricans</i>	P. Roberts (2009)	-	.	Exidie glanduleuse
<i>Exidia recisa</i>	(Ditmar : Fr.) Fr.	-	Prunus avium	Exidie obconique
<i>Fomes fomentarius</i>	(L. : Fr.) Fr.	-	.	Amadouvier
<i>Ganoderma lipsiense</i>	(Batsch) G.F.Atk., 1908	-	.	Ganoderme aplani
<i>Geastrum rufescens</i>	Pers. : Pers.	-	.	Géastre roux
<i>Gymnopilus penetrans</i>	(Fr. : Fr.) Murrill	-	.	Flammule pénétrante
<i>Hebeloma laterinum</i>	(Batsch) Vesterh.	-	.	Hébélome "Belle-Hélène"
<i>Helvella lactea</i>	Boud.	-	.	Helvelle blanc de lait
<i>Helvella macropus</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.	-	.	Helvelle à long pied
<i>Hydnum repandum</i>	L. : Fr.	-	.	Pied de mouton
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	(Wulfen : Fr.) Maire	-	.	Fausse girolle
<i>Hygrophorus eburneus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	-	.	Hygrophore blanc d'ivoire
<i>Hygrophorus penarius</i>	Fr., 1836	-	.	Hygrophore comestible
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 18	-	.	Hypholome en touffe
<i>Hypoxyylon fuscum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	Corylus avellana	
<i>Inocybe asterospora</i>	Quél., 1880	-	.	Inocybe à spores étoilées
<i>Irpex fimbriatus</i>	(Pers. : Fr.) Kotiranta &	-	Corylus avellana	Steccherine fimbriée
<i>Laccaria affinis</i>	(Singer) Bon, 1983	-	.	Laccaria à lames pâles
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke	-	.	Améthyste, petit violet
<i>Lactarius blennius</i>	(Fr.) Fr., 1838	-	.	Lactaire muqueux
<i>Lactarius camphoratus</i>	(Bull.) Fr., 1838	-	.	Lactaire camphré
<i>Lactarius deterrimus</i>	Gröger, 1968	-	.	Lactaire de l'épicéa
<i>Lactarius fluens</i>	Boud.	-	.	Lactaire coulant
<i>Lactarius pallidus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Lactaire pâle
<i>Lactarius rubrocinctus</i>	Fr., 1863	-	.	Lactaire cerné de rouge
<i>Lactarius salmonicolor</i>	Heim & Leclair	-	.	Lactaire saumoné
<i>Lactarius subdulcis</i>	(Pers. : Fr.) Gray	-	.	Lactaire presque doux
<i>Lactarius violascens</i>	(Otto : Fr.) Fr.	-	.	Lactaire violascent
<i>Langermannia gigantea</i>	(Batsch : Pers.) Rostkovi	-	.	Vesse de loup géante
<i>Laxitextum bicolor</i>	(Pers. : Fr.) Lentz, 1956	-	.	Stérée bicolore
<i>Leccinum carpini</i>	(R. Schulz) Moser ex D.A.	-	.	Bolet des charmes
<i>Lenzites betulinus</i>	(L. : Fr.) Fr.	-	.	Lenzite du bouleau

# Liste des taxons répertoriés le : 13/09/2024

## Sur le site: BERGONS (forêt d ARRAGNAT)

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Leotia lubrica</i>	(Scop.) Pers. : Fr.	- .		Léotie visqueuse
<i>Lepiota clypeolaria</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	- .		Lépiote en bouclier
<i>Lepiota ignivolvata</i>	Bousset & Josserand ex B	- .		Lépiote à base rouge
<i>Lepiota ventriospora</i>	D.A. Reid, 1958	- .		Lépiote à spores ventruées
<i>Lepista inversa</i>	(Scop. : Fr.) Pat.	- .		Clitocybe inversé
<i>Leucocortinarius bulbiger</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) St	- .		Cortinaire blanc bulbeux
<i>Lycoperdon mammaeforme</i>	Pers. : Pers.	- .		Vesse de loup voilée
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Pers., 1796	- .		Vesse de loup perlée
<i>Lycoperdon umbrinum</i>	Pers. : Pers.	- .		Vesse de loup brun d'ombre
<i>Macrolepiota fuliginosa</i>	(Barla) Bon, 1977	- .		Coulemelle sombre
<i>Marasmiellus foetidus</i>	(Sowerby : Fr.) Antonín,	- .		Marasme fétide
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	- .		Marasme à odeur d'ail
<i>Marasmius cohaerens</i>	(Pers. : Fr.) Cooke & Qué	- .		Marasme à pied corné
<i>Marasmius rotula</i>	(Scop. : Fr.) Fr.	- .		Marasme petite roue
<i>Marasmius wynneae</i>	Berk. & Broome	- .		Marasme globuleux
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & Po	- .		Collybie à larges lames
<i>Meripilus giganteus</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.	- .		Polypore géant
<i>Morganella pyriformis</i>	(Schaeff. : Pers.) Kreisel	- .		Vesse de loup en forme de poire
<i>Mycena acicula</i>	(Schaeff.) Kumm.	- .		Mycène très fine
<i>Mycena galericulata</i>	(Scop. : Fr.) Gray	- .		Mycène en casque
<i>Mycena polygramma</i>	(Bull. : Fr.) Gray	- .		Mycène à pied strié
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	- .		Mycène pure
<i>Mycena pura f. alba</i>	(Gillet) Kühner, 1938	- .		Mycène pure forme blanche
<i>Mycena rosea</i>	(Bull. ? Pers.) Gramberg	- .		Mycène rose
<i>Ombrophila pura</i>	(Pers. : Fr.) Baral	-	Fagus sylvatica	Bulgarie pure
<i>Oudemansiella mucida</i>	(Schrad. : Fr.) Höhn.	- .		Mucidule visqueuse
<i>Phaeolus schweinitzii</i>	(Fr. : Fr.) Pat.	-	Picea abies	Polypore des teinturiers
<i>Phallus impudicus</i>	L. : Pers.	- .		Phalle impudique
<i>Phellodon niger</i>	(Fr. : Fr.) P.Karst.	- .		Hydne noir
<i>Phlebiella vaga</i>	(Fr. : Fr.) P.Karst.	- .		
<i>Pholiota astragalina</i>	(Fr. : Fr.) Singer	- .		Pholiote astragale
<i>Pluteus boudieri</i>	P.D. Orton, 1960	- .		Plutée de Boudier
<i>Pluteus cervinus</i>	(Schaeff. ?) Kumm.	-	Fagus sylvatica	Plutée couleur de cerf
<i>Pluteus fenzi</i>	(Schulzer) Corriol & P.-A.	- .		
<i>Pluteus salicinus</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	- .		Plutée du saule
<i>Pluteus tricuspidatus</i>	Velen.	- .		Plutée à lame bordée de noir
<i>Polyporus durus</i>	(Timm) Kreisel	- .		Polypore bai
<i>Polyporus leptcephalus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr., 1821	- .		Polypore variable
<i>Postia pythogaster</i>	(F. Ludwig) Vesterh.	- .		Polypore fuligineux
<i>Postia stiptica</i>	(Pers. : Fr.) Jülich	Cf		Leptopore blanchâtre
<i>Postia subcaesia</i>	(A. David) Jülich, 1982	- .		Polypore bleuté
<i>Postia tephroleuca</i>	(Fr. : Fr.) Jülich, 1982	- .		Polypore blanc cendré
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	(Scop. : Fr.) P.Karst., 186	- .		Hydne gélatineux
<i>Ramaria botrytis</i>	(Pers. : Fr.) Ricken	- .		Clavaire chou-fleur
<i>Ramaria gracilis</i>	(Pers. : Fr.) Qué.	- .		Ramaire à odeur d'anis
<i>Rickenella swartzii</i>	(Fr. : Fr.) Kuyper	- .		Omphale de Swartz

# Liste des taxons répertoriés le : 13/09/2024

## Sur le site: BERGONS (forêt d ARRAGNAT)

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Rozites caperatus</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.	-	.	Pholiote ridée
<i>Russula albonigra</i>	(Krombh.) Fr.	-	.	Russule brûlée
<i>Russula aurea</i>	Pers., 1796	-	.	Russule dorée
<i>Russula cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.	-	.	Russule charbonnière
<i>Russula delica</i>	Fr., 1838	-	.	Russule "sans lait"
<i>Russula densifolia</i>	Gillet	-	.	Russule à lames denses
<i>Russula fellea</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Russule de fiel
<i>Russula foetens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	-	.	Russule fétide
<i>Russula grisea</i>	(Pers.?) Fr.	Cf	.	Russule gorge de pigeon
<i>Russula laurocerasi</i>	Melzer, 1920	-	.	Russule à odeur d'amande amère
<i>Russula lepida</i>	Fr., 1836	-	.	Russule jolie
<i>Russula mairei</i>	Singer, 1929	-	.	
<i>Russula nigricans</i>	(Bull. ?) Fr.	-	.	Russule noircissante
<i>Russula ochroleuca</i>	Pers.	-	.	Russule ocre et blanc
<i>Russula olivacea</i>	(Schaeff.) Fr.	-	.	Russule olivacée
<i>Russula puellaris</i>	Fr., 1838	-	.	Russule jaunissante
<i>Russula risigallina</i>	(Batsch) Sacc., 1915	-	.	Russule caméléon
<i>Russula vesca</i>	Fr., 1836	-	.	Russule comestible
<i>Russula violeipes f. citrina</i>	(Quél.) Romagn.	-	.	Russule à pied violet forme jaune
<i>Scleroderma citrinum</i>	Pers. : Pers., 1801	-	.	Scléroderme vulgaire
<i>Skelotocutis nemoralis</i>	A. Korhonen et Miettinen	-	.	
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	-	.	Stérée hirsute
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	-	Fagus sylvatica	Stérée hirsute
<i>Stereum insignitum</i>	Quél., 1889	-	.	Stérée remarquable
<i>Stereum ochraceoflavum</i>	(Schwein.) J.B. Ellis	-	.	Stérée ocre pâle
<i>Stereum rugosum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Stérée rugueuse
<i>Stereum sanguinolentum</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Fr	-	Picea abies	Stérée sanguinolente
<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	(Scop. : Fr.) Berk.	-	.	Bolet pomme de pin
<i>Trametes gibbosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Tramète bossue
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	-	Fagus sylvatica	Tramète versicolore
<i>Tremella encephala</i>	Willd. : Fr.	-	.	Trémelle en forme de cervelle
<i>Tremiscus helvelloides</i>	(DC. : Fr.) Donk	-	.	Guepine rougeâtre
<i>Tricholoma sciodes</i>	(Pers.) C. Martin	-	.	Tricholome gris
<i>Tricholoma sulphureum</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Tricholome soufré
<i>Tricholoma ustale</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	Tricholome brûlé
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer	-	.	Tricholome rutilant
<i>Tylopilus felleus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	-	.	Bolet de fiel
<i>Xerocomus badius</i>	(Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J.	-	.	Bolet bai
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Quél., 1888	-	.	Bolet à chair jaune
<i>Xerocomus ferrugineus</i>	(Schaeff.) Bon	-	.	Bolet ferrugineux
<i>Xerocomus pruinatus</i>	(Fr.) Quél.	-	.	Bolet pruineux
<i>Xerula radicata</i>	(Rehl. : Fr.) Dörfelt	-	.	Collybie radicante
<i>Xylaria polymorpha</i>	(Pers.) Grev., 1824	-	.	Xylaire polymorphe

Nombre de participants : 36

Nombre de taxons répertoriés : 177