

# Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 24/03/2024

Sur le site: SEMEAC ( Bois de LABARTHE)

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Annulohypoxydon minutellum</i>	(Syd. & P. Syd.) Y.M.Ju, J	-	Quercus	
<i>Auricularia auricula-judae</i>	(Bull. : Fr.) Wettstein, 189	-	Sambucus nigra	Oreille de Judas
<i>Chaetosphaerella phaeostroma</i>	(Durieu & Mont.) E.Müll.	-	.	
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	(Nyl.) Kanouse ex C.S.Ra	-	.	Pezize turquoise
<i>Coprinus nemoralis</i>	Bender, 1993	-	.	
<i>Daedalea quercina</i>	(L. : Fr.) Pers., 1801	-	Quercus	Lenzite du chêne
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	(Bolt. : Fr.) J. Schröt.	-	.	Tramète rougissante
<i>Daedaleopsis tricolor</i>	(Bull. : Fr.) Bondarzew &	-	.	Tramète rougissante
<i>Diatrypella quercina</i>	(Pers.) Cooke, 1866	-	Quercus	
<i>Eutypa maura</i>	(Fr. : Fr.) Fuckel	-	.	
<i>Exidia nigricans</i>	P. Roberts (2009)	-	.	Exidie glanduleuse
<i>Funalia trogii</i>	(Berk.) Bondarzew & Sing	-	.	Tramète du peuplier
<i>Galerina marginata</i>	(Batsch) Kühner, 1935	-	.	Galère marginée
<i>Hymenochaete corrugata</i>	(Fr. : Fr.) Lév.	-	Corylus avellana	Hyménochaète du noisetier
<i>Hypoloma fasciculare var. pusillum</i>	J.E. Lange, 1923	-	Quercus	Hypholome en touffe nain
<i>Hypoxydon fuscum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	Corylus avellana	
<i>Hypoxydon rubiginosum</i>	(Pers.) Fr., 1849	-	.	
<i>Hypoxydon ticinense</i>	L.E. Petrini	-	.	
<i>Irpex fimbriatus</i>	(Pers. : Fr.) Kotiranta &	-	.	Steccherine fimbriée
<i>Lenzites betulinus</i>	(L. : Fr.) Fr.	-	Quercus	Lenzite du bouleau
<i>Lycogala epidendrum</i>	(L.) Fr., 1829	-	.	Lait de loup
<i>Meruliopsis corium</i>	(Pers. : Fr.) Ginns	-	.	Mérule papyracée
<i>Mycena galericulata</i>	(Scop. : Fr.) Gray	-	.	Mycène en casque
<i>Nemania serpens</i>	(Pers. : Fr.) Gray	-	.	
<i>Panellus stipticus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	-	Quercus	Panelle styptique
<i>Peniophora cinerea</i>	(Pers. : Fr.) Cooke, 1879	-	.	Peniophore cendrée
<i>Peniophora polygonia</i>	(Pers. : Fr.) Bourdot & G	-	.	
<i>Peniophora quercina</i>	(Pers. : Fr.) Cooke	-	Quercus	Peniophore du chêne
<i>Phellinus punctatus</i>	(P.Karst.) Pilát, 1942	-	.	Phellin ponctué
<i>Phlebia rufa</i>	(Pers. : Fr.) M.P. Christia	-	.	Phlébie rousse
<i>Pleurotus ostreatus</i>	(Jacq.) Kumm., 1871	-	.	Pleurote en huître
<i>Polyporus tuberaster</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	-	.	Polypore tubéreux
<i>Schizophyllum commune</i>	Fr. : Fr., 1815	-	Quercus	Schizophylle commune
<i>Schizopora paradoxa</i>	(Schrad. : Fr.) Donk	-	.	Schizopore paradoxale
<i>Steccherinum ochraceum</i>	(Pers.) Gray, 1821	-	.	Hydne ocré
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	-	.	Stérée hirsute
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	-	.	Tramète versicolore
<i>Trichaptum bifforme</i>	(Fr.) Ryvarden, 1972	-	.	Polypore parchemin
<i>Vuilleminia coryli</i>	Boidin, Lanquetin & G. G	-	Corylus avellana	Vuilleminie du noisetier
<i>Xylodon sambuci</i>	(Pers.) Tura, Zmitr., Wass	-	.	

Nombre de participants : 18

Nombre de taxons répertoriés : 40