

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 28/07/2024

Sur le site: VAL LOURON

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Amanita crocea</i>	(Quél.) Singer, 1951	- .		Amanite safran
<i>Amanita excelsa</i>	(Fr. : Fr.) Bertillon	- .		Amanite élevée
<i>Amanita excelsa var. spissa</i>	(Fr.) Neville & Poumarat,	- .		Amanite épaisse
<i>Amanita junquillea</i>	Quél., 1877	- .		Amanite jonquille
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	- .		Golmotte, amanite vineuse
<i>Amanita rubescens f. alba</i>	Coker	- .		Amanite vineuse forme blanche
<i>Boletus aestivalis</i>	(Paulet) Fr., 1838	- .		Cèpe d'été, Cèpe réticulé
<i>Boletus calopus</i>	Pers. : Fr.	- .		Bolet à beau pied
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.	- .		Pied rouge
<i>Boletus subappendiculatus</i>	Dermek, Lazebnicek & Ve	- .		Bolet des sapins
<i>Bovista plumbea</i>	Pers. : Pers.	- .		Boviste couleur de plomb
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	- .		Calocère visqueuse
<i>Calvatia utriformis</i>	(Bull. : Pers.) Jaap	- .		Calvatie en outre
<i>Cantharellus amethysteus</i>	(Quél.) Sacc., 1887	- .		Girolle améthyste
<i>Chlorophyllum rhacodes</i>	(Vittad.) Vellinga	- .		Lépiote déguenillée
<i>Clavulina coralloides</i>	(L. : Fr.) J.Schröt., 1889	- .		Clavaire à crêtes
<i>Clitocybe gibba</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	- .		Clitocybe en entonnoir
<i>Coltricia perennis</i>	(L. : Fr.) Gray	- .		Coltricie
<i>Cortinarius camphoratus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	- .		Cortinaire à corne brûlée
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	(Bolt. : Fr.) J. Schröt.	- .		Tramète rougissante
<i>Daedaleopsis tricolor</i>	(Bull. : Fr.) Bondarzew &	- .		Tramète rougissante
<i>Diatrype decorticata</i>	(Pers. : Fr.) Rappaz	- .		
<i>Exidia pitya</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Fr	- .		Exidie des conifères
<i>Exobasidium rhododendri</i>	(Fuckel) Cramer	- .		Exobasidium du rhododendron
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	- .		Amadouvier des conifères
<i>Fuligo septica</i>	(L.) F.H.Wigg., 1780	- .		Fleur de tan
<i>Ganoderma carnosum</i>	Pat.	- .		Ganoderme luisant charnu
<i>Ganoderma lipsiense</i>	(Batsch) G.F.Atk., 1908	- .		Ganoderme aplani
<i>Hymenochaete cruenta</i>	(Pers. : Fr.) Donk	- .		Hymenochaète de Mougeot
<i>Hypoxylon rubiginosum</i>	(Pers.) Fr., 1849	- .		
<i>Inocybe calamistrata</i>	(Fr. : Fr.) Gillet	- .		Inocybe à base vert sombre
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer &	- .		Pholiote changeante
<i>Laccaria affinis</i>	(Singer) Bon, 1983	- .		Laccaire à lames pâles
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke	- .		Améthyste, petit violet
<i>Laccaria bicolor</i>	(Maire) P.D. Orton	- .		Laccaire bicolore
<i>Laccaria proxima</i>	(Boud.) Pat.	- .		
<i>Lactarius fuliginosus</i>	(Fr.) Fr., 1838	- .		Lactaire enfumé
<i>Lactarius lignyotus</i>	Fr., 1857	- .		Lactaire couleur de suie
<i>Lactarius subdulcis</i>	(Pers. : Fr.) Gray	- .		Lactaire presque doux
<i>Lactarius turpis</i>	(Weinm.) Fr.	- .		Lactaire plombé
<i>Lycogala epidendrum</i>	(L.) Fr., 1829	- .		Lait de loup
<i>Lycoperdon foetidum</i>	Bonord.	Val .		Vesse de loup fétide

Liste des taxons répertoriés le : 28/07/2024

Sur le site: VAL LOURON

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	- .		Marasme à odeur d'ail
<i>Marasmius oreades</i>	(Bolt. : Fr.) Fr.	- .		Faux mousseron
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kottaba & Po	- .		Collybie à larges lames
<i>Mycena pelianthina</i>	(Fr. : Fr.) Quél.	- .		Mycène livide
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	- .		Mycène pure
<i>Mycena pura f. alba</i>	(Gillet) Kühner, 1938	- .		Mycène pure forme blanche
<i>Paxillus involutus</i>	(Batsch : Fr.) Fr.	- .		Paxille enroulé
<i>Peziza badiofuscoidea</i>	Donadini	Val .		
<i>Phellinus hartigii</i>	(Allesch. & Schnabl) Pat.	- .		Amadouvier du sapin
<i>Phlebiella vaga</i>	(Fr. : Fr.) P.Karst.	- .		
<i>Pholiota astragalina</i>	(Fr. : Fr.) Singer	- .		Pholiote astragale
<i>Polyporus leptcephalus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr., 1821	- .		Polypore variable
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	(Fr.) E.-J. Gilbert	- .		Bolet porphyre
<i>Postia tephroleuca</i>	(Fr. : Fr.) Jülich, 1982	- .		Polypore blanc cendré
<i>Rickenella fibula</i>	(Bull. : Fr.) Raithelh., 197	- .		Omphale bibelot
<i>Russula amethystina</i>	Quél., 1898	- .		Russule améthyste
<i>Russula amoena</i>	Quél., 1881	- .		Russule agréable
<i>Russula cyanoxantha f. peltereaui</i>	Singer, 1925	- .		Russule charbonnière verte
<i>Russula faginea</i>	Romagn. ex Romagn.	- .		Russule écrevisse des hêtres
<i>Russula illota</i>	Romagn., 1954	- .		Russule mal lavée
<i>Russula saliceticola</i>	(Singer) Kühner ex Knuds	- .		Russule brun violacé
<i>Russula violeipes</i>	Quél., 1898	- .		Russule à pied violet
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	- .		Stérée hirsute
<i>Stereum sanguinolentum</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Fr	- .		Stérée sanguinolente
<i>Trichaptum abietinum</i>	(Dicks. : Fr.) Ryvarden	- .		Coriole du sapin
<i>Tricholoma pseudonictitans</i>	Bon, 1983	- .		Tricholome qui fait cligner des ye
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer	- .		Tricholome rutilant
<i>Tubaria ferruginea</i>	(Maire) ex Horak & P.-A.	Val .		
<i>Tylopilus felleus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	- .		Bolet de fiel
<i>Xerocomus badius</i>	(Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J.	- .		Bolet bai
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Quél., 1888	- .		Bolet à chair jaune
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	(L. : Fr.) Quél.	- .		Bolet subtomenteux

Nombre de participants : 8

Nombre de taxons répertoriés : 74