

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 19/10/2024

Sur le site: **CHIROULET**

Taxons		Hôte		Nom français
<i>Aleuria aurantia</i>	(Pers. : Fr.) Fuckel, 1870	-	.	Pézize orangée
<i>Amanita junquillea</i>	Quél., 1877	-	.	Amanite jonquille
<i>Amanita muscaria f. flavivolvata</i>	(Singer) Neville & Pouma	-	.	Amanite tue-mouche à voile jaunâ
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	-	.	Golmotte, amanite vineuse
<i>Armillaria mellea</i>	(Vahl : Fr.) Kumm.	-	.	Armillaire couleur de miel
<i>Ascocoryne sarcoides</i>	(Jacq. ex Fr.) J.W.Groves	-	.	Ascocoryne sarcoïde
<i>Bisporella citrina</i>	(Batsch : Fr.) Korf & S.E.	-	.	Bisporelle citrine
<i>Boletus edulis</i>	Bull. : Fr., 1782	-	.	Cèpe ,Cèpe de Bordeaux
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Pied rouge
<i>Bulgaria inquinans</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Bulgarie salissante
<i>Calocera cornea</i>	(Batsch : Fr.) Fr., 1827	-	.	Calocère cornée
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Calocère visqueuse
<i>Calvatia excipuliformis</i>	(Scop. : Pers.) Perdeck	-	.	Calvatie en coupe
<i>Cantharellus amethysteus</i>	(Quél.) Sacc., 1887	-	.	Girolle améthyste
<i>Cantharellus cibarius</i>	Fr. : Fr.	-	.	Girolle, chanterelle
<i>Cantharellus friesii</i>	Quél., 1872	-	.	Chanterelle abricot
<i>Clavulina coralloides</i>	(L. : Fr.) J.Schröt., 1889	-	.	Clavaire à crêtes
<i>Clitocybe dealbata</i>	(Sowerby : Fr.) Kumm.	Cf	.	Clitocybe blanchi
<i>Clitocybe fragrans</i>	(With. : Fr.) Kumm.	-	.	Clitocybe anisé strié
<i>Clitocybe geotropa</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	-	.	Tête de moine, Clitocybe géotrope
<i>Cortinarius orellanus</i>	Fr., 1838	-	.	Cortinaire couleur de rocou
<i>Cortinarius purpurascens</i>	Fr., 1838	-	.	Cortinaire purpurescent
<i>Craterellus cornucopioides</i>	(L. : Fr.) Pers.	-	.	Trompette des morts
<i>Cuphophyllus niveus</i>	(Scop. ? Fr.) Bon	-	.	Hygrophore blanc
<i>Cuphophyllus pratensis</i>	(Pers. : Fr.) Bon	-	.	Hygrophore des prés
<i>Cuphophyllus virgineus</i>	(Wulfen : Fr.) Kovalenko	-	.	
<i>Cystoderma amianthinum</i>	(Scop.) Fayod, 1889	-	.	Cystoderme amiantacé
<i>Cystoderma carcharias</i>	(Pers.) Fayod, 1889	-	.	Cystoderme requin ou dentelé
<i>Galerina marginata</i>	(Batsch) Kühner, 1935	-	.	Galère marginée
<i>Ganoderma carnosum</i>	Pat.	-	.	Ganoderme luisant charnu
<i>Geastrum sessile</i>	(Sowerby) Pouzar, 1971	-	.	Géastre frangé
<i>Helminthosphaeria clavariarum</i>	(L.R.Tulasne) Fuckel	-	.	Parasite de clavaire
<i>Helvella crispa</i>	(Scop.) : Fr.	-	.	Helvelle crépue
<i>Helvella elastica</i>	Bull. : Fr.	-	.	Helvelle élastique
<i>Helvella lacunosa</i>	Afz. : Fr., non (Pers.)	-	.	Helvelle lacuneuse
<i>Helvella sulcata</i>	Afzel., 1783	-	.	
<i>Hydnum repandum</i>	L. : Fr.	-	.	Pied de mouton
<i>Hydnum rufescens</i>	Pers. : Fr.	-	.	Pied de mouton roux
<i>Hygrocybe conica</i>	(Schaeff. : Fr.) P.Kumm.,	Cf	.	Hygrophore conique
<i>Hygrocybe psittacina</i>	(Schaeff. : Fr.) Kumm.	-	.	Hygrophore perroquet
<i>Hygrocybe punicea</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	Hygrophore rouge ponceau
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	(Wulfen : Fr.) Maire	-	.	Fausse girolle

Liste des taxons répertoriés le : 19/10/2024

Sur le site: **CHIROULET**

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Hygrophorus pudorinus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Hygrophore pudibond
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 18	-	.	Hypholome en touffe
<i>Inocybe geophylla</i>	(Sowerby : Fr.) P.Kumm.,	-	.	Inocybe à lames terreuses
<i>Laccaria affinis</i>	(Singer) Bon, 1983	-	.	Laccaire à lames pâles
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke	-	.	Améthyste, petit violet
<i>Laccaria bicolor</i>	(Maire) P.D. Orton	-	.	Laccaire bicolore
<i>Lactarius aurantiacus</i>	(Pers.) Gray, 1821	-	.	Lactaire orangé
<i>Lactarius salmonicolor</i>	Heim & Leclair	-	.	Lactaire saumoné
<i>Lactarius subdulcis</i>	(Pers. : Fr.) Gray	-	.	Lactaire presque doux
<i>Lactarius vellereus</i>	(Fr.) Fr., 1838	-	.	Lactaire velouté
<i>Lentinellus ursinus</i>	(Fr. : Fr.) Kühner	-	.	Lentin couleur d'ours
<i>Leotia lubrica</i>	(Scop.) Pers. : Fr.	-	.	Léotie visqueuse
<i>Lepiota rhodorhiza</i>	Romagn. & Locquin ex P.	-	.	Lépiote à rhizoïdes rouges
<i>Lepista inversa</i>	(Scop. : Fr.) Pat.	-	.	Clitocybe inversé
<i>Lepista nebularis</i>	(Batsch : Fr.) Harmaja	-	.	Clitocybe nébuleux
<i>Lepista nuda</i>	(Bull. : Fr.) Cooke	-	.	Pied bleu
<i>Lycogala epidendrum</i>	(L.) Fr., 1829	-	.	Lait de loup
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Pers., 1796	-	.	Vesse de loup perlée
<i>Lycoperdon umbrinum</i>	Pers. : Pers.	-	.	Vesse de loup brun d'ombre
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	-	.	Marasme à odeur d'ail
<i>Marasmius oreades</i>	(Bolt. : Fr.) Fr.	-	.	Faux mousseron
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & Po	-	.	Collybie à larges lames
<i>Morganella pyriformis</i>	(Schaeff. : Pers.) Kreisel	-	.	Vesse de loup en forme de poire
<i>Mycena aurantiomarginata</i>	(Fr. : Fr.) Quél.	-	.	Mycène élégante
<i>Mycena crocata</i>	(Schrad. : Fr.) Kumm.	-	.	Mycène à lait orangé
<i>Mycena rosea</i>	(Bull. ? Pers.) Gramberg	-	.	Mycène rose
<i>Oudemansiella mucida</i>	(Schrad. : Fr.) Höhn.	-	.	Mucidule visqueuse
<i>Panaeolus sphinctrinus</i>	(Fr.) Quél., 1872	-	.	Panéole à marge dentée
<i>Phallus impudicus</i>	L. : Pers.	-	.	Phalle impudique
<i>Phlebia merismoides</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Phlébie orangée
<i>Phlebia tremellosa</i>	(Schrad. : Fr.) K.K. Naka	-	.	Mérule tremblante
<i>Plicaturopsis crispa</i>	(Pers. : Fr.) D.A. Reid	-	.	Plicature du hêtre
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	(Scop. : Fr.) P.Karst., 186	-	.	Hydne gélatineux
<i>Rhodocybe gemina</i>	(Paulet ex Fr.) Kuyper &	-	.	Rhodocybe tronqué
<i>Rhodocybe nitellina</i>	(Fr.) Singer, 1947	-	.	Rhodocybe cuivré
<i>Russula acrifolia</i>	Romagn. ex Romagn.	-	.	Russule à lames âcres
<i>Russula badia</i>	Quél., 1881	-	.	Russule baie
<i>Russula cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.	-	.	Russule charbonnière
<i>Russula nigricans</i>	(Bull. ?) Fr.	-	.	Russule noircissante
<i>Russula ochroleuca</i>	Pers.	-	.	Russule ocre et blanc
<i>Russula olivascens</i>	Fries (1861) (nom. illegit.	-	.	
<i>Russula queletii</i>	Fr., 1872	-	.	Russule de Quelet
<i>Sarcomyxa serotina</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.	-	.	Pleurote tardif
<i>Schizophyllum commune</i>	Fr. : Fr., 1815	-	.	Schizophylle commune
<i>Scleroderma areolatum</i>	Ehrenb.	-	.	Scléroderme aréolé
<i>Stictis radiata</i>	(L.) Pers., 1800	-	.	

Liste des taxons répertoriés le : 19/10/2024

Sur le site: CHIROULET

Taxons		Hôte		Nom français
<i>Stropharia semiglobata</i>	(Batsch : Fr.) Quél., 1872	-	.	Strophaire demi sphérique
<i>Tricholoma saponaceum var. carneifolium</i>	Bertault	-	.	
<i>Tricholoma sulphureum</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Tricholome soufré
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer	-	.	Tricholome rutilant
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Quél., 1888	-	.	Bolet à chair jaune
<i>Xylaria hypoxylon</i>	(L. : Fr.) Grev.	-	.	Xylaire du bois

Nombre de participants : 0

Nombre de taxons répertoriés : 94